


¿QUÉ ES LA NALOXONA?

- La naloxona (Narcan[®], Evzio[®]) es un medicamento que revierte temporalmente los peligrosos efectos de una sobredosis de opioides
- Sirve si tiene opioides, como fentanilo, heroína y opioides recetados, en el organismo
- La naloxona puede darse cada 2 a 3 minutos hasta que la persona vuelva a respirar
- Una persona no puede drogarse con la naloxona; tampoco genera adicción

ES EFICAZ SOLO durante 30 a 120 minutos.



La muerte por sobredosis de opioides puede prevenirse. Actúe rápido siguiendo los pasos de la derecha. Aprenda a usar la naloxona y salve una vida.

RECURSOS

Recursos en Michigan para la adicción a los opioides

► michigan.gov/opioids

Capacitación en línea sobre la naloxona

► overdoseACTION.org

Línea nacional de ayuda de la Administración de Servicios de Abuso de Sustancias y Salud Mental (SAMHSA)

Servicio gratuito y confidencial de información y remisión para tratamientos, disponible las 24 horas del día, 7 días a la semana, 365 días al año, para personas con trastornos mentales o por abuso de sustancias

► 1-800-662-HELP (4357)

Michigan-OPEN.org | medicqi.org

INFORMACIÓN QUE DEBE SABER:

NALOXONA




OPEN

Evidence. Resources. Engagement.




INSTRUCCIONES PARA USAR NARCAN® INTRANASAL SPRAY

1



Abra el paquete

2



Ponga la boquilla en la nariz

3



Presione el émbolo para administrar el aerosol

No es necesario rociar para probar el dispositivo

- NO se demore en llamar al 911
- No le inyecte nada a la persona
- No ponga a la persona en la bañera ni la ducha
- No le dé nada para tomar
- No le eche agua en la cara

La ley de Michigan lo protege de responsabilidad si le da naloxona a una persona con sobredosis y llama al 911.

REDUCIR LOS DAÑOS

- No mezcle opioides con otros medicamentos, **particularmente benzodiazepinas o cualquier cosa que le pueda dar sueño**
- Sea consciente de los cambios de tolerancia en su cuerpo.
- Dígales a sus amigos y familiares en dónde guarda la naloxona y cómo usarla.
- Vaya despacio; nunca consuma drogas solo; siempre lleve naloxona

RECUERDE LOS SIGUIENTES PASOS



DESPERTAR (HAGA LAS 3 COSAS):

- Gritar el nombre de la persona
- Sacudir los hombros enérgicamente
- Frotar el esternón con los nudillos



COMPROBAR SI HAY SEÑALES DE SOBREDOSIS:

- La respiración es lenta o la persona ha dejado de respirar
- Labios o uñas de color azul/gris
- Ronquido profundo/gorgoteo
- No hay respuesta al dolor
- Pupilas contraídas



LLAMAR AL 911:

- Dígale al personal de emergencias: "Creo que tiene una sobredosis".



DAR LA NALOXONA INTRANASAL:

- Dele naloxona



OXÍGENO:

- Respiración boca a boca:
- Cabeza hacia atrás
- Pellizque la nariz
- Levante la barbilla
- 1 soplo cada 5 segundos
- RCP si sabe hacerla
- siga las instrucciones del personal de emergencias



DAR NALOXONA NUEVAMENTE:

- Dele la naloxona cada 2 a 3 minutos hasta que la persona empiece a despertar
- Si debe dejar sola a la persona, o si vomita, póngala en la posición de recuperación (vea el dibujo abajo)

Quédese con la persona hasta que llegue la ayuda, si es seguro hacerlo.

